

BISOLVON® JARABE
BROMHEXINA CLORHIDRATO

Expectorante - Mucolítico

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento, contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no esta seguro de algo, consulte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición:

Cada 5 mL de jarabe adulto contienen

Bromhexina clorhidrato 8 mg

Excipientes: Maltitol, sucralosa, ácido benzoico, aroma cereza, aroma chocolate, mentol, agua purificada c.s.

Cada 5 mL de jarabe infantil contienen

Bromhexina clorhidrato 4 mg

Excipientes: Maltitol líquido, ácido benzoico, hietelosa, saborizante frutilla, saborizante cereza, sucralosa, agua purificada c.s.

¿Qué es y para qué se utiliza?

BISOLVON® es un expectorante-Muclítico

BISOLVON® está indicado en aquellas enfermedades bronquiales en las que la producción de flema es exagerada y su eliminación deficiente.

Este medicamento es utilizado como terapia secretolítica en enfermedades broncopulmonares crónicas y agudas asociados a secreción mucosa anormal y trastornos del transporte mucoso.

Como se usa Bisolvon

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Jarabe adultos 8 mg/5 mL

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 mL (8 mg) 3 veces al día

Niños mayores de 6 a ≤12 años: 2,5 mL (4 mg) 3 veces al día

Para medir la dosis se debe utilizar el vaso dosificador incluido.

Jarabe infantil 4 mg/5 mL

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL (8 mg) 3 veces al día

Niños mayores de 6 a ≤12 años: 5 mL (4 mg) 3 veces al día

Niños de 2 a ≤6 años: 2,5 mL (2 mg) 3 veces al día

Niños menores de 2 años: 1,25 mL (1 mg) 3 veces al día

Para medir la dosis se debe utilizar el vaso dosificador incluido.

Generalidades

BISOLVON jarabe no contiene azúcar, por lo que es adecuado para diabéticos y niños pequeños.

BISOLVON puede tomarse con o sin alimentos

BISOLVON aumenta la producción de flemas, reduce su viscosidad ayudando a su eliminación. De este modo facilita la expectoración y calma la tos.

No tomar Bisolvon

Si usted es alérgico (hipersensible) a la bromhexina o cualquiera de los demás componentes.

Uso de otros Medicamentos

No se han informado interacciones desfavorables con otros medicamentos.

Fertilidad, embarazo y lactancia:

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de BISOLVON durante el embarazo.

Se desconoce si la bromhexina y sus metabolitos se excretan en la leche humana, por lo tanto, **BISOLVON no debe utilizarse durante la lactancia.**

No hay indicios de posibles efectos del uso de bromhexina sobre la fertilidad

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios sobre el efecto de BISOLVON sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Tenga especial cuidado con Bisolvon

Si usted padece el trastorno hereditario raro de intolerancia a la fructosa no debe tomar este medicamento. Este producto puede tener un leve efecto laxante.

Si usted usa más de lo debido

Se desconoce manifestaciones de intoxicaciones por sobredosis en el ser humano, sin embargo, de presentarse se recomienda consultar inmediatamente al médico llevando el envase del medicamento. La sobredosis tiene síntomas similares a los efectos adversos conocidos de BISOLVON.

En caso de una sobredosis, concurra al centro asistencial más cercano,

Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, BISOLVON puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Aunque BISOLVON es bien tolerado pueden ocurrir malestares gastrointestinales leves, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal superior. También, se puede producir hinchazón de la piel, erupción cutánea, y picazón.

Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este folleto, informe a su médico o químico farmacéutico.

Presentación:

Frasco con 120 mL Jarabe

Mantener fuera del alcance de los niños

No use productos con fecha de vencimiento posterior a la indicada en el envase.

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños

Importado por Sanofi Aventis de Chile S.A., Avda. Presidente Riesco 5435, piso 18, Las Condes, Santiago.

Bajo licencia de Sanofi, Paris, Francia.